

## Réseau des sylviculteurs/trices en faveur des bois précieux

Fiche signalétique : Bois-dessus

Mise à jour 2012

OBJET no 004

**Localisation**

coord.: X: 540.593  
Y : 177.596

commune. Valeyres/Ursin  
surface (a) 40  
altitude : 540  
exposition : est  
mm/an 950  
pente % : 5-15  
roche molassique, en bute



**Sylviculteur**

**Michel Félix**  
Garde forestier de triage  
[michel.felix@vd.ch](mailto:michel.felix@vd.ch)  
Tél. :079-449'52'09



Spécificité propre au réseau: **Noyer hybride – Noyer noir – N. commun – Merisier commun**

**Technique/méthode sylvicole:** sylviculture d'arbre → élagage de la bille de pied (8m), taille formation

**Données du peuplement/objet (en 2012)**

**Peupl. principal : stade développement, âge**

Perchis assez structuré et différencié  
Plantation 1989 sur ancienne futaie d'épicéas: noyers noirs et hybrides par groupes, noyer commun naturel

**Peuplement accessoire**

Hêtre, frêne, noisetiers, frênes; ronces encore bien présentes

**Origine**

essence	nat.	artific.	origine
Noyer hybr.		X	Pép. Payre MI 209
Noyer noir			Pép. Payre
Noyer com.	X		
Merisier	X		

**Genre/degré /forme du mélange (en %, abrégé)**

strate sup: 20 n.noir-20 noy h. – 20 noy – 20 mer – 20 frê

strate moy.: frê, hê, noisetiers

strate inf.: ronces, noisetiers, frê

**Différentiation sociologique des essences**

essence	noy n	noy h	n. com	frê	mer
prédominant					
dominant		X	X	X	X
codominant	X				
dominé					
surcimé					

Merisier > noyer hybr > noyer comm. > noyer noir

**Sylviculture**

**Objectif et principes cultureux**

Production de bois précieux, bille de pied de 6-8m  
favoriser les plus vitaux et dégager leur houppier  
Concentration accroissement sur arbres de place

**But de composition :** 40 mer-20 noy h-30 noy noir-10 noy c.

**Mesures**

Date	interventions
1989	Plantation sur coupe définitive épicéas
???	Soins protection ??
2004	1 <sup>er</sup> élagage arbres de place, dégagements
2005	Finir les dégagements
2009	Eclaircie /élimination certains frê, 2 <sup>ème</sup> élagage

**Suite „mesures**

Date	interventions


A faire prochainement (2013) :  
poursuivre les dégagements et élagage 3<sup>ème</sup> étape  
Commentaire : la station ne convient pas forcément aux noyers  
→ trop sec, sol pas assez fertile  
Au verso : précisions sur la surface de référence avec quelques  
sujets emblématiques mesurés

## Réseau des sylviculteurs/trices en faveur des bois précieux

### Sujets témoin mesurés (objet no 004)

no	essence	âge	allure	Ø	circ.	H <sub>tot</sub>	H <sub>piéd</sub>	date
1	Noyer noir	24	rectiligne, dominant	19	60	12	4	5.10.12
2	Noy. comm.	24	fourche à 7 m	15	46	11	3	5.10.12
3	Noy hybride	24	vital, dominant	20	62	14	4	5.10.12
4	Merisier	24	fourche à 6m, très vital, bon houppier	22	70	12	3	5.10.12
5								

### Localisation des sujets témoin (schématiquement)



### Informations supplémentaires

→ voir photos années